

Medicijn in het kort voor **Nitrofurantoin** Capsules om **een blaasontsteking te voorkomen**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt om een blaasontsteking te voorkomen.

Hoe werkt dit medicijn?

Een blaasontsteking is een ontsteking door bacteriën. Dit medicijn doodt bacteriën. U krijgt dit medicijn als u vaak een blaasontsteking heeft.

Dit medicijn voorkomt een nieuwe blaasontsteking. Als u dit medicijn gebruikt, heeft u 66% minder kans op een nieuwe blaasontsteking.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de capsule in met eten, melk of yoghurt. U wordt dan minder snel misselijk en het werkt dan beter.

Neem de capsule heel in. **Niet kauwen.**

Neem de capsule in vlak voor u gaat slapen. Plas eerst uw blaas leeg en neem daarna pas de capsule in. Dit medicijn kan dan de hele nacht werken in uw blaas.

Gebruikt u dit medicijn alleen omdat u vaak een blaasontsteking krijgt na seks? Neem de capsule dan binnen 2 uur na de seks in.



vergeten

Bent u de capsule vergeten in te nemen? U neemt de capsule 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de vergeten capsule dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken tot de laatste weken vóór de uitgerekende datum van bevalling.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste waarschuwingen

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Haaruitval (tijdelijk).
- Hoofdpijn.
- Duizelig zijn.
- Maagklachten en darmklachten.
- Donkere plas. Dit is normaal.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Tintelingen, geen gevoel in uw handen of voeten.
- Hoesten of moeilijk kunnen ademen.
- Geelzucht. Hierbij worden uw oogwit en huid geel.
- Huiduitslag.



Heeft u 1 van deze bijwerkingen? Neem dan direct contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dan kan het niet vochtig worden. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.