

Medicijn in het kort voor **Nitrofurantoïne**

Capsules met gereguleerde afgifte bij **blaasontsteking**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij blaasontsteking.

Hoe werkt dit medicijn?

Een blaasontsteking is een ontsteking door bacteriën. Dit medicijn doodt bacteriën.

U heeft meestal **na een paar dagen minder klachten**.

Belangrijkste waarschuwingen



Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de capsule in met eten, melk of yoghurt. U wordt dan minder snel misselijk en het werkt dan beter.

Neem de capsule heel in. **Niet kauwen**.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.

Neem uw laatste capsule van de dag vlak voor u gaat slapen in. Plas eerst uw blaas leeg en neem daarna pas de capsule in. Dit medicijn kan dan de hele nacht werken in uw blaas.

Maak de hele kuur af. Ook als u denkt dat u beter bent. Er kunnen nog bacteriën in uw blaas zitten.



Bent u de capsule vergeten in te nemen? Duurt het **meer dan 4 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de vergeten capsule dan direct in. Duurt het **minder dan 4 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over. U neemt de capsule alsnog aan het einde van uw kuur.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken tot de laatste weken vóór de uitgerekende datum van bevalling.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Haaruitval (tijdelijk).
- Hoofdpijn.
- Duizelig zijn.
- Maagklachten en darmklachten.
- Donkere plas. Dit is normaal.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Tintelingen, geen gevoel in uw handen of voeten.
- Hoesten of moeilijk kunnen ademen.
- Geelzucht. Hierbij worden uw oogwit en huid geel.
- Huiduitslag.



Heeft u 1 van deze bijwerkingen? Neem dan direct contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dan kan het niet vochtig worden. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.