

# Samenvatting van nitroglycerine pleister

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nitroglycerine maakt uw bloedvaten wijder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- Bij hartkramp (angina pectoris)
- Om een aderontsteking (tromboflebitis) te voorkomen als u een infuus krijgt dat minimaal 2 dagen duurt.

## Gebruik

Nitroglycerine is er als pleister.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

1. Scheur het zakje met de pleister open. Haal de pleister uit het zakje.
2. Haal de beschermende folie eraf.
3. Probeer het **plakkende deel niet met uw vingers aan te raken**.
4. Plak de pleister op een **schone** en **droge** plaats op de **linker of rechterkant van uw borstkas** of aan de **binnenkant van uw bovenarm**.
5. Druk de pleister goed aan.

**Let op!** Plak de pleister **elke dag op een andere plaats**. Anders kan de pleister uw huid irriteren.

Gebruikt u de pleister **overdag** bij angina pectoris? **Verwijder de pleister voordat u gaat slapen**. Als dit medicijn de hele dag in uw bloed zit, dan kan het effect minder worden.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn, soms bent u hierbij misselijk. Dit wordt na een paar dagen minder.
- duizelig zijn
- rode huid, irritatie en jeuk op de plaats van de pleister.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

