

Medicijn in het kort voor **Oxycodon**

Capsules bij **pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij erge pijn, zoals na operaties, na een ongeluk en bij kanker.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn is een sterke pijnstiller.

Het maakt uw pijn minder. U heeft meestal binnen 1 uur minder pijn. Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang.

Belangrijkste waarschuwingen



Drink geen grapefruitsap en eet geen **grapefruit** als u dit medicijn gebruikt. U kunt dan last krijgen van bijwerkingen.



Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. Anders wordt het moeilijk om te stoppen en werkt dit medicijn minder goed.

Gebruikt u dit medicijn al voor een aantal weken en wilt u **stoppen**? Stop dan niet in 1 keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: onrust, overgeven, zweten en niet kunnen slapen. Vraag uw arts of apotheker om advies als u wilt stoppen met dit medicijn.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik dit medicijn volgens een vast schema.



Neem de capsule in met een half glas water.



Bent u de capsule vergeten in te nemen? U neemt dit medicijn niet meer dan 6 keer per dag. Neem de vergeten capsule direct in.

Wacht in ieder geval 4 uur voordat u de volgende capsule inneemt.

Let op!



Als u begint met dit medicijn mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u niet suf of duizelig bent.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Gebruik dit medicijn niet vlak voor de bevalling.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Verstopping. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxemiddel gebruiken.
- Maagklachten en darmklachten. Zoals diarree, buikpijn of misselijk zijn.
- Suf, slaperig of duizelig zijn.
- Hoofdpijn.
- Jeuk.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Moeilijk kunnen ademen.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.