

# Samenvatting van oxycodon

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxycodon is een **sterke pijnstiller**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- ernstige pijn. Zoals na operaties, na een ongeluk, of door kanker.
- pijn bij mensen die niet meer beter worden tijdens hun laatste levensfase.

Tabletten, capsules en drank met oxycodon werken binnen 1 uur. Het werkt 4 tot 6 uur lang. De tabletten met vertraagde afgifte werken 12 uur lang.

## Gebruik

Oxycodon is er als tabletten, capsules, smelttabletten en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten en capsules met oxycodon

Slik de tablet of de capsule met een half glas water.

**Let op!** Gebruikt u de tabletten met vertraagde afgifte? Hier komt oxycodon langzaam uit vrij. De tabletten **niet fijnmaken of kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

### Smelttabletten met oxycodon

1. Laat de tablet in uw mond smelten.
2. Slik de tablet door.

### Drank met oxycodon

Meet de drank af met een druppelpipet, maatlepel, druppelaar, maatbekertje of doseerspuitje.

Gebruik oxycodon zolang u hevige pijn heeft. Doe dit volgens een vast schema.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- erge verstopping in uw darmen. Gebruik daarom elke dag een laxermiddel.
- andere klachten aan uw maag of darmen. Zoals: diarree, buikpijn en misselijk zijn
- suf, slaperig en duizelig zijn
- jeuk

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen

**Let op!** Als u oxycodon lang gebruikt, kunt u verslaafd raken. Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk.



**Let op!** Heeft u oxycodon lang gebruikt en wilt u stoppen? **Stop niet in één keer**. Anders kunt u last krijgen van klachten. Vraag uw apotheker of arts om advies.



**Let op!** Eet of drink bij dit medicijn niet te veel grapefruit. Door grapefruit kunt u meer kans op bijwerkingen krijgen.



**Let op!** U mag **niet** autorijden als u last heeft van bijwerkingen.

Gebruikt u oxycodon **elke dag**?

Dan mag u de eerste 2 weken niet autorijden.

Gebruikt u **af en toe** 10 milligram of minder per keer? Iedere keer als u dit gebruikt mag u 12 uur niet autorijden.

Gebruikt u **af en toe** meer dan 10 milligram per keer? Of gebruikt u langwerkende tabletten? Na iedere inname mag u 16 uur niet autorijden.



**Let op** met alcohol als u oxycodon gebruikt. Alcohol kan u extra suf of slaperig maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik oxycodon niet vlak voor de bevalling.



**Let op!** Geef geen borstvoeding als u oxycodon gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

