

Samenvatting van perindopril

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Perindopril maakt uw bloeddruk lager. Ook zorgt het ervoor dat uw hart beter pompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij een hoge bloeddruk
- bij hartfalen
- na een hartaanval

Perindopril maakt uw bloeddruk lager binnen 6 weken.

Bij hartfalen heeft u minder moeite met ademen. Ook worden uw enkels minder dik.

Gebruik dit medicijn elke dag. Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Gebruik

Perindopril is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Slik dit medicijn het liefst **in de ochtend**. Doe dat een half uur voor het ontbijt. **Neem dit medicijn niet in met eten.** Dan werkt het niet goed.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Duizelig worden bij het opstaan. Dat gebeurt vooral in het begin. Slik dit medicijn daarom de **eerste dagen in de avond** als u op bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.
- Kriebelhoest.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Perindopril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met perindopril.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

