

# Medicijn in het kort voor **Remdesivir**

## Infuus bij **COVID-19**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ernstige infectie met het coronavirus (COVID-19).

U krijgt dit medicijn als u in het ziekenhuis ligt met een longontsteking en extra zuurstof nodig heeft. En als u geen buis in uw luchtpijp heeft om u te helpen met ademen als u start met dit medicijn.

### Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn remt het coronavirus. Dit betekent dat het moeilijker wordt voor het virus om nog meer virusdeeltjes te maken in uw lichaam.

Hierdoor ligt u 4 tot 6 dagen **korter in het ziekenhuis**. En heeft u minder lang extra **zuurstof** nodig.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Dit medicijn zit in een zak met vloeistof. De vloeistof loopt door een slangetje en naald uw bloedvat in. Dit heet een infuus.

Uw arts of verpleegkundige zal u het infuus geven.

Het duurt ongeveer een half uur tot 2 uur voordat dit medicijn helemaal in uw lichaam zit.

U krijgt dit medicijn 1 keer per dag.

U krijgt dit medicijn 5 tot 10 dagen.

### Let op!



Als u dit medicijn krijgt bent u waarschijnlijk te ziek om auto te rijden. Het is nog niet zeker of u met dit medicijn veilig kunt autorijden. Vraag aan uw arts of u mag autorijden.



Als u dit medicijn krijgt bent u waarschijnlijk te ziek om alcohol te drinken. Van alcohol kunt u ook last krijgen van uw maag en darmen. Drink daarom geen alcohol.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn en het coronavirus in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Schade aan de lever. Vaak merkt u hier niks van. Uw arts zal daarom voor en tijdens het gebruik van dit medicijn controleren hoe het met uw lever gaat. Uw arts neemt hiervoor bloed af.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hoofdpijn.
- Misselijk zijn.
- Huiduitslag.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Dit medicijn wordt in het ziekenhuis bewaard.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.