

Medicijn in het kort voor **Salbutamol**

Inhalatiepoeder bij **COPD (Cyclocaps, Diskus, Novolizer)**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij de longziekte COPD (chronische obstructieve longziekte). U kunt last hebben van veel en vaak hoesten en moeite met ademen.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn maakt uw luchtwegen open. Het werkt binnen 5 minuten na het inademen. **U voelt zich snel minder benauwd en kunt beter ademen.** Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang.

Dit medicijn maakt uw klachten minder. Maar uw COPD gaat niet over.

Belangrijkste waarschuwingen

Dit medicijn op de juiste manier inademen is niet makkelijk. Uw apotheek geeft u uitleg hoe u dit medicijn goed gebruikt. Of bekijk het filmpje op apotheek.nl.

Laat elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn nog goed inademt.

Heeft u moeite met het gebruik van uw inhalator? Vraag uw arts of apotheker of een ander soort inhalator geschikter voor u is.

Vraag in de apotheek om extra uitleg als u twijfelt of u dit medicijn goed gebruikt.



Heeft u geen schema van uw arts gekregen? En gebruikt u dit medicijn vaker dan 2 keer per week? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Het is belangrijk dat u dit medicijn goed gebruikt. Alleen als u op de juiste manier inhaleert (inademt), komt het medicijn diep genoeg in uw longen om te werken. Lees voor de uitgebreide uitleg de bijsluiter of kijk op apotheek.nl. Daar vindt u ook een filmpje over hoe u moet inhaleren.

U hoeft dit medicijn meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent. Behalve als uw arts u een schema heeft gegeven.



Moet u een paar keer op een dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

Wordt u benauwd als u veel beweegt? Bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u dit medicijn 10 tot 15 minuten gebruiken voordat u zich gaat inspannen.



Spoel na het inhaleren uw mond met water. Drink daarna een slok water. U voorkomt hiermee gaatjes in uw gebit.



Bent u dit medicijn vergeten te gebruiken? U hoeft dit medicijn meestal alleen te inhaleren als u benauwd bent. Heeft uw arts u een schema gegeven? Gebruik dit medicijn dan direct. **Wacht in ieder geval 4 uur tot u dit medicijn weer gebruikt.**

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hartkloppingen, snelle hartslag, trillende handen, hoofdpijn of hoesten.

Deze bijwerkingen horen binnen een paar uur na inademen van dit medicijn te verdwijnen. U zult hier na een tijdje minder last van krijgen, omdat u aan dit medicijn zult wennen. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Vraag dan uw arts om advies.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Vieze smaak, brandend gevoel of pijn in de mond en keel. Ook kunnen gaatjes in de tanden ontstaan.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.