

Medicijn in het kort voor **Salbutamol**

Inhalatiespray bij **COPD (Airomir autohaler, Redihaler)**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij de longziekte COPD (chronische obstructieve longziekte). U kunt last hebben van veel en vaak hoesten en moeite met ademen.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn maakt uw luchtwegen open. Het werkt binnen 5 minuten na het inademen. **U voelt zich snel minder benauwd en kunt beter ademen.** Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang.

Dit medicijn maakt uw klachten minder. Maar uw COPD gaat niet over.

Belangrijkste waarschuwingen

Dit medicijn op de juiste manier inademen is niet makkelijk. Uw apotheek geeft u uitleg hoe u dit medicijn goed gebruikt. Of bekijk het filmpje op apotheek.nl.

Laat elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn nog goed inademt.

Heeft u moeite met het gebruik van uw inhalator? Vraag uw arts of apotheker of een ander soort inhalator geschikter voor u is.

Vraag in de apotheek om extra uitleg als u twijfelt of u dit medicijn goed gebruikt.



Heeft u geen schema van uw arts gekregen? En gebruikt u dit medicijn vaker dan 2 keer per week? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Het is belangrijk dat u dit medicijn goed gebruikt. Alleen als u op de juiste manier inhaleert (inademt), komt het medicijn diep genoeg in uw longen om te werken. Lees voor de uitgebreide uitleg de bijsluiter of kijk op apotheek.nl. Daar vindt u ook een filmpje over hoe u moet inhaleren.

U hoeft dit medicijn meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent. Behalve als uw arts u een schema heeft gegeven.



Moet u een paar keer op een dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

Wordt u benauwd als u veel beweegt? Bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u dit medicijn 10 tot 15 minuten gebruiken voordat u zich gaat inspannen.



Spoel na het inhaleren uw mond met water. Drink daarna een slok water. U voorkomt hiermee gaatjes in uw gebit.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten te gebruiken? U hoeft dit medicijn meestal alleen te inhaleren als u benauwd bent. Heeft uw arts u een schema gegeven? Gebruik dit medicijn dan direct. **Wacht in ieder geval 4 uur tot u dit medicijn weer gebruikt.**

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hartkloppingen, snelle hartslag, trillende handen, hoofdpijn of hoesten.

Deze bijwerkingen horen binnen een paar uur na inademen van dit medicijn te verdwijnen. U zult hier na een tijdje minder last van krijgen, omdat u aan dit medicijn zult wennen. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Vraag dan uw arts om advies.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Vieze smaak, brandend gevoel of pijn in de mond en keel. Ook kunnen gaatjes in de tanden ontstaan.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Bewaar het niet in de koelkast of de vriezer.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.