

# Samenvatting van salicylzuur bij wratten, likdoorns en schimmelnagels

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Salicylzuur maakt de bovenste laag (hoornlaag) van de huid en de nagel zacht.

Salicylzuur werkt bij:

- wratten
- likdoorns en eeltknobbels
- schimmelnagels

## Gebruik

Salicylzuur is er als aanstipvloeistof en als zalf. Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Aanstipvloeistof of zalf met salicylzuur

1. Houd de wrat, likdoorns of schimmelnagels eerst een paar minuten in warm water. Dit maakt de plek of nagel zachter.
2. Droog daarna goed af.
3. **Let op!** Zorg dat salicylzuur niet op gezonde huid komt. Bescherm de omliggende huid met een likdoornring. Of breng een dun laagje vaseline aan.
4. Smeer daarna salicylzuur op de wrat, likdoorns of schimmelnagel.
5. Plak de plek af met tape of pleister.

Na een paar dagen kunt u de bovenste laag afschuren of afvijlen. Na een paar weken kunnen de klachten verdwenen zijn. Soms duurt het een paar maanden.

**Let op!** Gebruik dit medicijn niet in het gezicht of in de buurt van wondjes. Laat het niet in het oog of op de oogleden komen. Gebeurt dit per ongeluk toch? Spoel dan goed met water.

**Let op!** De **aanstipvloeistof** verdampt snel en is **brandbaar**. Draai direct het dopje weer op het flesje nadat u het heeft gebruikt.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Jeuk of een geïrriteerde huid. Dit gaat binnen een paar minuten over.
- De gezonde huid kan beschadigen als het medicijn er op komt.
- Droge huid of een trekkerig gevoel op de aangedane plek.
- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? U mag dit medicijn maximaal 2 weken op kleine oppervlakken gebruiken. Wilt u dit medicijn langer gaan gebruiken? Of op meer plekken die groter zijn dan een handpalm? Overleg dan eerst met uw arts of apotheker.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. **Let op!** Gebruik dit medicijn alleen op kleine oppervlakken. En smeer het niet op de borst of rond de tepel.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

