

# Samenvatting van sildenafil

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Sildenafil maakt sommige bloedvaten wijder. Hierdoor kan uw bloed er beter doorheen stromen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- moeite om een stijve penis te krijgen (erectieproblemen)
- hoge bloeddruk in uw longen

### Bij erectieproblemen

Na een half uur tot 1 uur wordt uw penis stijf door seksuele prikkeling. Dit medicijn werkt ongeveer 4 uur.

### Bij hoge bloeddruk in de longen

Na ongeveer 12 weken wordt u minder benauwd.

## Gebruik

Sildenafil is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injectie. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met sildenafil

Slik de tablet met een glas water.

Gebruikt u dit medicijn bij **erectieproblemen? Dan krijgt u alleen de tabletten.** Neem de tablet dan **1 uur voor de seks.**

### Drank met sildenafil

1. Schud de fles 10 seconden goed om.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een doseerspuit of maatbeker.
3. Neem deze hoeveelheid in.
4. Spoel de doseerspuit of maatbeker af met water.

**De drank met sildenafil wordt alleen gebruikt bij een hoge bloeddruk in de longen.**

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- blozen
- diarree
- spierpijn
- rugpijn
- duizelig worden
- wazig zien. Bel uw arts als u opeens minder goed ziet.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

**Let op!** Gebruik sildenafil **niet vaker dan 1 keer per dag bij erectieproblemen.** Anders krijgt u veel bijwerkingen.

## Waarschuwingen

**Let op!** Heeft u een **hart- en vaatziekte?** Dan kunt u weer klachten krijgen. Ook als u een hartaanval of beroerte had, kunt u klachten krijgen. **Krijgt u pijn op uw borst?** Bel dan meteen een arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

