

Medicijn in het kort voor **Simvastatine**

Tabletten bij **een te hoog cholesterol**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij te veel cholesterol in uw bloed. Van te veel cholesterol gaan uw bloedvaten dicht zitten.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn verlaagt cholesterol en andere vetten in uw bloed.

Als de vetten in uw bloed weer normaal zijn heeft u **30% minder kans op een hartaanval of beroerte.**

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



U kunt dit medicijn het beste **'s avonds** innemen. Na het eten of voordat u naar bed gaat. Het werkt dan beter. 's Nachts maakt uw lever namelijk meer cholesterol aan.



U kunt dit medicijn met en zonder eten innemen.



Bent u de tablet vergeten in te nemen?

Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in.
Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Sla de vergeten tablet dan over.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. U heeft een grotere kans op schade aan uw lever als u alcohol drinkt en dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor uw baby.

Belangrijkste waarschuwingen



Drink geen grapefruitsap en eet geen **grapefruit** als u dit medicijn gebruikt. U kunt dan meer last krijgen van bijwerkingen.



Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Maagklachten of darmklachten. Zoals buikpijn, verstopping of misselijk zijn.
- Hoofdpijn, duizelig zijn of moeite hebben met in slaap vallen. Deze klachten zijn na een paar dagen weg.
- Spierpijn. Dit is meestal niet ernstig. Ga naar uw arts als u erge spierpijn krijgt.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.