

# نبذة مختصرة عن لقاح - سبيكيفاكس (موديرنا) المُضاد لكورونا-19

حقوق © من إصدار المشهور هذه المعلومات الواردة فيه. المحتوى على مدونات كلية حول هذا اللقاح يرجى قرائة الشارة الرسمية للمعهد الوطني (RIVM)، والالتزام باتفاق نصائح طبيك. تاريخ آخر تعديل: 3 مارس 2022. لا يمكن أن تنشأ أو تُشتمل أي

## الآثار الجانبية الأساسية

كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، قد تظهر عليك بعض الآثار الجانبية بعد حلقتك بجرعة اللقاح. السبب في ظهور معظم الآثار الجانبية هو أن اللقاح يجعل دفاعات الجسم تعمل. وتعمل هذه الدفاعات على الحماية من فيروس كورونا.

وقد أظهرت الدراسات أن الآثار الجانبية التالية هي الأكثر شيوعاً: الشعور بألم في موضع الحقن (92%).

- الشعور بالتعب (70%).
- الصداع (65%).
- آلام العضلات (62%).
- آلام المفاصل (46%).
- التشعيرية (45%).
- الغثيان والقيء (23%).
- الشعور بألم وتورم في الغدد الملفاوية تحت الإبط (20%).

عادة ما تستمر هذه الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام.

من الآثار الجانبية الخطيرة التي نادراً ما تحدث التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.

## هل ترغب في معرفة المزيد من المعلومات

هل لديك أستئلة أو شكوك حول الحصول على اللقاح؟ تناقش مع طبيبك أو مع الصيدلي بشأن ذلك.

للاطلاع على النشرة الرسمية لهذا اللقاح، يُرجى زيارة [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl).

مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [coravaccinatie.nl](http://coravaccinatie.nl).

هل ترغب في الإبلاغ عن أثر جانبي أو معرفة المزيد عنه؟ هذا متاح من خلال [lareb.nl](http://lareb.nl).

## انتبه!



يمكنك القيادة بعد الحصول على هذا اللقاح.  
لا تقود السيارة إذا كنت تعاني من آثار جانبية مثل الشعور بالتعب.



هل أنت حامل؟ وفقاً للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، فإن اللقاح آمن للسيدات الحوامل.

## التحذيرات الرئيسية

أسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك تلقي هذا اللقاح إذا كنت:  
هل سبق أن عانيت من رد فعل تحسسي تجاه أحد اللقاحات.

- ينصح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) بتحديد موعد جديد في الحالات التالية:  
إذا كنت مريضاً جداً أو تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة قبل الحصول على اللقاح.  
إذا كنت مصاباً بكورونا-19. أو إذا كان هناك احتمال بأنك مصاب بكورونا-19.  
إذا فاتك موعد الحصول على اللقاح.

احتمالية حدوث التهاب في عضلة القلب أو التهاب التامور ضئيلة للغاية. عندما يحدث ذلك، عادة ما يكون في غضون أسبوعين. يحدث ذلك عادة بعد الحصول على الجرعة الثانية وعادة لدى الشباب. لذا، اتصل بطبيبك على الفور إذا عانيت مما يلي بعد الحصول على اللقاح:  
ألم الصدر.  
عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.  
خفقان القلب.

## متى أحصل على هذا اللقاح؟

يمكنك الحصول على هذا اللقاح إذا كان عمرك 12 عاماً أو أكثر.  
تحدد الحكومة الوطنية من سيتلقى الدعوة للحصول على هذا اللقاح.



سوف تحصل على هذا اللقاح مرتين. سوف تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 4 أسابيع على الأقل من الحصول على الجرعة الأولى.



سوف يتم إعطاؤك حقنة اللقاح في أعلى ذراعك.



## كيف يعمل هذا اللقاح؟

إذا تعرضت لفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح، فسوف يتعرف جسمك على هذا الفيروس.  
لأن جسمك سوف يكون قد أنتج بالتأكيد أجساماً مضادة تحميك من هذا الفيروس. وذلك سوف يجنبك أن تمرض بسبب هذا الفيروس، وإذا أصبت بالمرض فسوف تكون الأعراض خفيفة.

تحتاج إلى الحصول على جرعتين من اللقاح لتمتع بحماية جيدة ضد فيروس كورونا. بعد 14 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية سوف تصبح ممتلكاً بالحماية ضد فيروس كورونا.

تُظهر الدراسات الأولية أن هذا اللقاح يقلل من خطر الإصابة بكورونا-19 بنسبة 94%. وذلك يعني أنه من بين كل 100 شخص يصابون بكورونا-19 دون الحصول على اللقاح، سوف يُصاب 6 أشخاص فقط بكورونا-19 بعد الحصول على اللقاح.

## كيف تم اعتماد هذا اللقاح؟

- لقد تم إجراء الكثير من الدراسات حول سلامة وفعالية هذا اللقاح. وقد تم إجراء هذه الدراسات في وقت واحد، وليس بالتتابع. وقد وفر ذلك الكثير من الوقت.  
وتم تقييم نتائج هذه الدراسات بشكل مباشر.  
لم يتم تخطي أي خطوات مهمة من خطوات التحقق من سلامة وفعالية اللقاح.