

Samenvatting van tamsulosine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tamsulosine ontspant de spieren van blaas en prostaat.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- problemen met plassen door een vergrote prostaat
- nierstenen
- plasklachten bij mannen

Dit medicijn werkt niet bij iedereen even goed. Als het bij u werkt, merkt u na 6 weken dat uw klachten minder worden. Blijft u last houden van uw klachten? Neem dan contact op met uw arts. Dit medicijn werkt dan mogelijk niet bij u.

Gebruik

Tamsulosine is er als tabletten en capsules. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Gebruikt u dit medicijn bij problemen met plassen door een vergrote prostaat of bij andere plasklachten? Dan kan het zijn dat u tamsulosine samen met een andere medicijn krijgt.

Tabletten met tamsulosine

1. Slik de tablet héél door met een glas water, zonder te kauwen.
2. U kunt dit medicijn met of zonder eten innemen.

Capsules met tamsulosine

1. Slik de capsule héél door met een glas water, zonder te kauwen.
2. Heeft u moeite met slikken? Dan mag u de **capsule openen. Slik de korrels zonder te kauwen!**
3. Neem dit medicijn na het eten in.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn door een te lage bloeddruk
- klachten van de maag en darmen
- hoofdpijn
- verstopte neus

De meeste bijwerkingen gaan over als u dit medicijn langer gebruikt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! U mag dit medicijn **niet** gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

