

Medicijn in het kort voor **Tramadol**

Bruistabletten bij **pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij erge pijn, zoals na operaties, na een ongeluk en bij kanker.

Het wordt ook gebruikt bij pijn door schade aan een zenuw (zenuwpijn) en wanneer het kraakbeen in uw gewrichten dunner wordt (artrose).

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn is een sterke pijnstiller. Het maakt uw pijn minder.

De bruistabletten werken snel. U heeft meestal **binnen 1 uur minder pijn**. Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang.

Belangrijkste waarschuwingen



Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. Anders wordt het moeilijk om te stoppen en werkt dit medicijn minder goed.

Gebruikt u dit medicijn al voor een lange tijd en wilt u **stoppen**? Stop dan niet in één keer.

U kunt last krijgen van klachten zoals: onrust, overgeven, niet kunnen slapen en in de war zijn.

Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.



Doe de bruistablet in een glas water. Wacht tot het bruisen is gestopt en drink op. Spoel het glas daarna met water en drink dat ook op.



U kunt de bruistablet met en zonder eten innemen.



Bent u de bruistablet vergeten in te nemen? Lees de bijsluiter voor wat u moet doen of kijk op apotheek.nl.

Let op!



Als u begint met dit medicijn, of als uw dosering hoger wordt mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u niet suf of duizelig bent.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Gebruik dit medicijn niet vlak voor de bevalling.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Verstopping en droge mond. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.
- Misselijk zijn en braken.
- Suf, slaperig of duizelig zijn.
- Heel veel zweten.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.