

Medicijn in het kort voor **Tramadol**

Capsules met vertraagde afgifte bij **pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij erge pijn, zoals na operaties, na een ongeluk en bij kanker.

Het wordt ook gebruikt bij pijn door schade aan een zenuw (zenuwpijn) en wanneer het kraakbeen in uw gewrichten dunner wordt (artrose).

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn is een sterke pijnstiller. Het maakt uw pijn minder.

U heeft **binnen een paar uur minder pijn**. Dit medicijn werkt 12 uur lang.

Dit zijn capsules met vertraagde afgifte. Dit betekent dat dit medicijn langzaam uit de tablet komt. Daardoor blijft dit medicijn langer in uw bloed.

Belangrijkste waarschuwingen



Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. Anders wordt het moeilijk om te stoppen en werkt dit medicijn minder goed.

Gebruikt u dit medicijn al voor een lange tijd en wilt u **stoppen**? Stop dan niet in één keer.

U kunt last krijgen van klachten zoals: onrust, overgeven, niet kunnen slapen en in de war zijn.

Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.



Neem de capsule in met een half glas water. Of maak de capsule open boven een lepel. Neem de korrels in met een half glas water. **Niet op de korrels kauwen of fijnmaken.** Dit medicijn komt anders in 1 keer vrij en dan kunt u bijwerkingen krijgen.



U kunt de capsule met en zonder eten innemen.



Bent u de capsule vergeten in te nemen? Duurt het **meer dan 4 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de vergeten capsule dan direct in. Duurt het **minder dan 4 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over.

Let op!



Als u begint met dit medicijn, of als uw dosering hoger wordt mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u niet suf of duizelig bent.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Gebruik dit medicijn niet vlak voor de bevalling.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Verstopping en droge mond. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.
- Misselijk zijn en braken.
- Suf, slaperig of duizelig zijn.
- Heel veel zweten.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apothek.nl of vraag uw arts of apotheker.