

Uw compacte bijsluiter voor **Acetylsalicylzuur** Bruistabletten bij **koorts, griep, verkouden zijn en pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Gebruik dit medicijn bij koorts, griep, verkouden zijn en verschillende soorten pijn. Zoals hoofdpijn, keelpijn, spierpijn en pijn als u ongesteld bent.

Wat doet dit medicijn voor u?

Dit medicijn zorgt ervoor dat u minder pijn heeft en het maakt uw koorts lager. Het werkt meestal binnen een half uur. Dit medicijn werkt 3 tot 6 uur lang.

Belangrijkste waarschuwingen



Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Kinderen van 12 jaar en ouder:

Neem per keer 1 bruistablet van **324 mg**. Wacht in ieder geval 4 uur tot u de volgende bruistablet inneemt. Maximaal 6 bruistabletten per dag.
Of

Neem per keer 1 bruistablet van **500 mg**. Wacht in ieder geval 6 uur tot u de volgende bruistablet inneemt. Maximaal 4 bruistabletten per dag.

Volwassenen:

Neem per keer 2 of 3 bruistabletten van **324 mg**. Wacht in ieder geval 4 uur tot u de volgende bruistabletten inneemt. Maximaal 12 bruistabletten per dag.
Of

Neem per keer 1 of 2 bruistabletten van **500 mg**. Wacht in ieder geval 4 uur tot u de volgende bruistabletten inneemt. Maximaal 8 bruistabletten per dag.



Los de bruistablet op in een glas water. Wacht tot het bruisen is gestopt en drink op. Spoel het glas daarna met water en drink dat ook op.

Neem dit medicijn bij voorkeur in op een **lege maag**. Het werkt dan het snelst. U mag dit medicijn ook met eten innemen. Dit medicijn begint dan later te werken.
Heeft u snel last van uw maag? Neem de bruistablet dan na wat eten.



Bent u dit medicijn vergeten in te nemen? Neem de bruistablet direct. Neem nooit meer dan in de bijsluiter staat.

Wat moet u nog meer weten?



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Van alcohol kunt u last krijgen van uw maag. Drink daarom liever geen alcohol.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby in uw buik. Niet gebruiken in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Dit kan slecht zijn voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn tot u geen klachten meer heeft. Of tot uw klachten minder zijn geworden. Heeft u na **5 dagen** nog steeds **klachten**? Ga dan naar uw arts.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Maagklachten en darmklachten. Zoals brandend maagzuur, maagpijn, misselijk zijn en overgeven.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Bloedingen, zoals een bloedneus, bloedend tandvlees of sneller blauwe plekken krijgen.
- Maagzweren, darmzweren of bloedingen in maag of darm. Bent u ouder dan 70 jaar? Of heeft u eerder een maagzweer of darmzweer gehad? Of gebruikt u bloedverdunners? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaars dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.