

Uw compacte bijsluiter voor **Chloortalidon**

Tabletten bij **hartfalen**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een hart dat minder goed pompt (hartfalen).

Wat doet dit medicijn voor u?

Dit medicijn is een plasmiddel. Door vaker te plassen gaat het extra vocht uit uw lichaam. U bent dan minder moe en minder benauwd. Ook heeft u minder dikke enkels. Uw bloeddruk wordt hierdoor ook lager. Dit medicijn werkt binnen 2 uur.

Belangrijkste waarschuwingen



Ga naar uw arts als u last krijgt van spierkramp, zwakke spieren, hartkloppingen en moe zijn. Dit kan betekenen dat u te weinig kalium in uw bloed heeft.



Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



U kunt dit medicijn met en zonder eten innemen.



U kunt dit medicijn het beste **'s ochtends** innemen. U heeft dan minder last van het feit dat u vaker moet plassen.

Moet u veel plassen op momenten dat het niet goed uitkomt? Dan kunt u dit medicijn op een andere tijd slikken. Slik dit medicijn niet na 16.00 uur. Want dan moet u vaak 's nachts opstaan om te plassen.



Bent u dit medicijn vergeten? **U neemt dit medicijn 1 keer per dag.** Neem de tablet direct in als het nog geen 16.00 uur is. Is het later dan 16.00 uur? Sla de tablet dan over. **U neemt dit medicijn 1 keer per 2 dagen.** Duurt het meer dan 24 uur tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de tablet dan direct in. Duurt het minder dan 24 uur? Sla de tablet dan over.

Wat moet u nog meer weten?



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. U kunt erg duizelig worden als u alcohol drinkt en dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Spierkramp of spierpijn
- Moe zijn
- Hartkloppingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Duizelig zijn, vooral de eerste paar dagen bij het opstaan. Dit gaat vaak over als uw lichaam gewend is aan de lagere bloeddruk.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.